

## 全国 2018 年 4 月高等教育自学考试

## 儿科护理学(一)试题

课程代码:03003

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

## 选择题部分

## 注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

**一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。**

1. 自出生后脐带结扎开始至生后 28 天内,称为  
A. 胎儿期      B. 新生儿期      C. 婴儿期      D. 幼儿期
2. 小儿各系统的发育快慢不一,其中发育最晚的是  
A. 神经系统      B. 淋巴系统      C. 肌肉组织      D. 生殖系统
3. 小儿出生时,平均头围是  
A. 30cm      B. 32cm      C. 34cm      D. 36cm
4. 某小儿,16 个月,生长发育正常,其乳牙数目约是  
A. 4~6 个      B. 6~8 个      C. 8~10 个      D. 10~12 个
5. 断奶的适当时期是  
A. 6~10 个月      B. 8~12 个月      C. 10~14 个月      D. 12~16 个月
6. 下列疫苗中属于混合制剂的是  
A. 麻疹疫苗      B. 百白破疫苗  
C. 乙肝疫苗      D. 脊髓灰质炎疫苗
7. 患儿入暖箱后,应定时测量体温,体温未升至正常之前,测量频率为  
A. 1 次/小时      B. 1 次/2 小时      C. 1 次/3 小时      D. 1 次/4 小时
8. 过期产儿的胎龄是  
A. >40 周      B. ≥40 周      C. >42 周      D. ≥42 周
9. 下列不符合早产儿外观特点的是  
A. 耳廓发育良好      B. 皮肤薄嫩、皮下脂肪少  
C. 指(趾)甲薄而短,未达到指端      D. 男婴睾丸未降入阴囊

10. 某男婴,出生后4天,乳腺肿大如蚕豆,此种现象为  
A. 正常生理状态      B. 乳腺发育异常  
C. 乳腺肿物      D. 需要挤压
11. 进行新生儿复苏时,首先应建立通畅的呼吸道,摆好体位,肩部以布卷垫高  
A. 1~1.5cm      B. 1.5~2cm      C. 2~2.5cm      D. 2.5~3cm
12. 重度缺氧缺血性脑病患儿的瞳孔改变,以下除外  
A. 对光反应消失      B. 不等大      C. 扩大      D. 缩小
13. II度营养不良患儿的腹部皮下脂肪层厚度是  
A. 0.8~1.2cm      B. 0.4~0.8cm      C. 0.4cm以下      D. 基本消失
14. 佝偻病初期可出现  
A. 方颅      B. 鸡胸      C. 肌肉关节松弛      D. 夜惊、多汗
15. 为预防佝偻病,口服维生素D的剂量为  
A. 200IU/d      B. 300IU/d      C. 400IU/d      D. 500IU/d
16. 疱疹性咽峡炎的病原体为  
A. 呼吸道合胞病毒      B. 流感病毒  
C. 柯萨奇A组病毒      D. 腺病毒
17. 婴幼儿肺炎行鼻导管给氧时,氧流量和氧浓度分别为  
A. 0.5~1L/min, <40%      B. 1~2L/min, <40%  
C. 1~2L/min, <50%      D. 2~4L/min, <40%
18. 低钾血症的临床表现,错误的是  
A. 神经肌肉兴奋性减低      B. 肠鸣音亢进  
C. 躯干和四肢肌无力      D. 腱反射减弱或消失
19. 法洛四联症由四种畸形组成,其中最重要的是  
A. 肺动脉狭窄      B. 室间隔缺损      C. 主动脉骑跨      D. 右心室肥厚
20. 某先天性心脏病患儿,胸部X线检查可见肺门“舞蹈”征,该先心病是  
A. 房间隔缺损      B. 室间隔缺损      C. 动脉导管未闭      D. 法洛四联症
21. 急性白血病患儿确立诊断和判断疗效的主要依据是  
A. 血常规检查      B. 组织化学染色      C. 溶菌酶检查      D. 骨髓检查
22. 营养性缺铁性贫血多见于  
A. 出生至2个月      B. 6个月至2岁的婴幼儿  
C. 2岁至6岁的儿童      D. 6岁以上的儿童
23. 治疗小儿原发性肾病综合征的主要药物是  
A. 泼尼松      B. 环磷酰胺      C. 氢氯噻嗪      D. 肝素

24. 急性肾衰患儿在少尿期造成死亡的主要原因是出现了  
A. 高磷血症      B. 高镁血症      C. 高钾血症      D. 高钙血症
25. 21 - 三体综合征的临床表现,错误的是  
A. 通贯手      B. 智能低下      C. 四肢短小      D. 眼距窄
26. 过敏性紫癜的典型特点是反复出现  
A. 皮肤紫癜      B. 肠套叠      C. 血尿      D. 蛋白尿
27. 不属于甲状腺功能减低症临床表现的是  
A. 特殊面容和体态      B. 智能低下  
C. 生长发育加快      D. 生理功能低下
28. 暴发败血症型流脑的致死原因主要是  
A. 血压升高      B. 休克      C. 出血      D. 窒息
29. 结核病小儿使用过的敷料应  
A. 高压蒸汽消毒      B. 消毒液浸泡消毒  
C. 煮沸消毒      D. 焚烧
30. 小儿口对口人工呼吸,吹气与排气的时间之比为  
A. 1:1      B. 1:2      C. 1:3      D. 1:4

### 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

#### 二、填空题:本大题共 10 空,每空 1 分,共 10 分。

31. 坐高是指头顶至\_\_\_\_\_的长度。3岁以下取仰卧位测量,称\_\_\_\_\_。
32. 婴幼儿的咽鼓管较宽、直、短,呈\_\_\_\_\_位,鼻咽炎时易导致\_\_\_\_\_。
33. 新生儿败血症是致病菌进入血液循环,并在其中\_\_\_\_\_及产生\_\_\_\_\_,而造成全身性的感染。
34. 小儿测量心率和脉搏时,应在\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_时测量。
35. 遗传性疾病包括基因病、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_三类。

#### 三、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。

36. 生长发育
37. 儿童保健
38. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症
39. 骨髓外造血
40. 川崎病

**四、简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。**

41. 简述小儿代谢性酸中毒的临床表现。
42. 简述肺炎合并心力衰竭的临床表现。
43. 简述对先天性心脏病患儿手术前的健康教育内容。
44. 简述化脓性脑膜炎患儿脑脊液改变特点。
45. 简述毒鼠药中毒特点。

**五、论述题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。**

46. 论述小儿液体疗法时补液的注意事项。
47. 某新生儿,女,足月,难产。出生后测心率 95 次/分,呼吸浅表,哭声弱,四肢稍屈曲,弹足底或导管插鼻反应有些皱眉动作,躯干红,四肢青紫。诊断为新生儿窒息,立即给予心肺复苏。请问:
  - (1)该新生儿的 Apgar 评分是多少分? (2 分)
  - (2)该患儿主要护理问题是什么? (2 分)
  - (3)复苏后的观察和护理包括哪些内容? (6 分)